

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

急性鼻炎・アレルギー性鼻炎などによる 鼻づまり・鼻みずについて <鼻炎用点鼻薬>

カイゲン点鼻薬

鼻づまり・鼻みずに『カイゲン点鼻薬』でシュッと解消

かぜによる鼻みずばかりではなく、花粉やハウスダストによるアレルギー性の鼻炎もたいへんうっとうしく、苦しい気分にはせられます。

噴霧式の『カイゲン点鼻薬』は、有効成分の微細な粒子が、鼻腔の奥深くまで均一にゆきわたり、鼻粘膜の炎症をおさえるので、鼻みずが止まり、息苦しい鼻づまりも解消されて、鼻がスッキリしてきます。

一度スプレーした液は逆流しませんので、衛生的に使用できます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

(2) 3日間位使用しても症状がよくなる場合

効能又は効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重

用法及び用量

次の1回量を鼻腔内に噴霧してください。


なお、3時間以上の間隔をおいて使用してください。

年 齢	1 回量	1 日使用回数
成人（15才以上）及び7才以上の小児	1～2度ずつ	1～5回
7才未満	使用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用のみ使用してください。

カイゲン点鼻薬の使い方



- * 最初にお使いになるときは、薬液が霧状になるまで数回押してください。
- * 容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにして使用してください。
- * 使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等でふきとり、キャップをしてください。
- * 容器の中に少量の薬液が残りますが、残量を見込んで充填しています。

成分及び分量

30mL中に次の成分を含んでいます。

成 分	含量	はたらき
塩酸ナファゾリン	15mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻の通りを改善します。
マレイン酸クロルフェニラミン	30mg	抗ヒスタミン作用により、花粉などによるくしゃみ・鼻づまり・鼻みずなどのアレルギー症状をおさえます。
塩化ベンゼトニウム	3mg	鼻腔内に付着した細菌に対し、殺菌作用をあらわし、清潔にします。

添加物として、塩化Naを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 外箱に表示の使用期限内にご使用ください。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン お客様相談室 電話 06-6202-8911

受付時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）