

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

急性鼻炎・アレルギー性鼻炎などによる 鼻づまり・鼻みず

＜鼻炎用点鼻薬＞

カイゲン点鼻薬

第2類医薬品

鼻づまり・鼻みずに『カイゲン点鼻薬』でシュッと解消

かぜによる鼻みずばかりではなく、花粉やハウスダストによるアレルギー性の鼻炎もたいへんうっとうしく、苦しい気分にはさせられます。

噴霧式の『カイゲン点鼻薬』は、有効成分の微細な粒子が、鼻腔の奥深くまで均一にゆきわたり、鼻粘膜の炎症をおさえるので、鼻みずが止まり、息苦しい鼻づまりも解消されて、鼻がスッキリしてきます。

一度スプレーした液は逆流しませんので、衛生的に使用できます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- (2) 3日間位使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重

用法・用量

次の1回量を鼻腔内に噴霧してください。


なお、3時間以上の間隔をおいて使用してください。

年 齢	1回量	1日使用回数
成人（15才以上）及び7才以上の小児	1～2度ずつ	1～5回
7才未満	使用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)点鼻用のみ使用してください。

使い方について



- ＊最初にお使いになるときは、薬液が霧状になるまで数回押してください。
- ＊容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにして使用してください。
- ＊使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等でふきとり、キャップをしてください。
- ＊容器の中に少量の薬液が残りますが、残量を見込んで充填しています。

成分・分量

30mL中に次の成分を含んでいます。

成 分	含量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	15mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻の通りを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、花粉などによるくしゃみ・鼻づまり・鼻みずなどのアレルギー症状をおさえます。
ベンゼトニウム塩化物	3mg	鼻腔内に付着した細菌に対し、殺菌作用をあらわし、清潔にします。

添加物として、塩化Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン お客様相談室 電話 06-6202-8911
受付時間：9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元
株式会社 カイゲン
大阪市中央区道修町2丁目5番14号

製造販売元
日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3