

鼻炎用点鼻薬 コルゲンヨーワ鼻炎ジェット

コルゲンヨーワ鼻炎ジェットは、鼻づまり、鼻みず、くしゃみといったつらい鼻炎の症状にすぐれた効きめをあらわす点鼻薬です。

- 霧状になった有効成分が鼻の奥の患部にまで直接とどくように設計されている定量噴霧スプレー容器です。
- シュッと噴霧すると、4種類もの効きめの成分が霧状の微粒子となって均一にひろがり、鼻粘膜の不快感を改善します。
- 清涼化剤*l*-メントールとペパーミント香料の同時配合により、スキッとクールな使用感になっています。

つらい鼻炎症状が続くと、物事に集中できなくなって、仕事や日常生活にまで影響を及ぼしかねません。ですから、いつでもどこでも、効きめのすぐれたコルゲンヨーワ鼻炎ジェットで早めの手当てをすることが大切です。シュッと噴霧すると、つらい鼻炎の症状がおさまリ、鼻が気持ちよく通ってまいります。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- (2) 3日間位使用しても症状がよくならない場合

成分・分量 (1mL中)

成分・分量		働 き
ナファゾリン塩酸塩	0.5mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、ハレや充血をおさえ、鼻づまりなどを緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	5.0mg	鼻づまり、鼻みず、くしゃみなどの症状をやわらげます。
ベンザルコニウム塩化物	0.2mg	細菌による感染を防ぎ、鼻腔内を清潔にします。
リドカイン	3.0mg	鼻粘膜の痛み、かゆみをしずめます。

〔添加物〕クエン酸、塩化Na、エタノール、*l*-メントール、香料

効能・効果

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

用法・用量

下記の量を鼻腔内に噴霧する。なお、適用間隔は3時間以上おくこと。

年 齢	1回量	1日使用回数
成人（15歳以上）及び 7歳以上の小児	1～2度ずつ	1～5回
7歳未満の幼児	使用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>


- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがある。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4)点鼻用のみ使用すること。

<容器の正しい使い方>

①  キャップをはずし、図のようにノズルを上にして容器を持ってください。（なお、最初には使用する時は、液が正常に噴霧するまで数回押してください。）	②  図のように立てたままでノズルの先端部を鼻腔内に入れ、1回に1～2度ずつ噴霧してください。（なお、噴霧時は容器を横にしないでください。）	③  使用後はノズルを清潔なティッシュペーパー等でふき、キャップをして保管してください。
--	---	---

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)他の人と共用しないこと。
- (5)使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は使用しないこと。



本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造販売元 日東薬品工業株式会社 京都府向日市上植野町南開35-3