

使用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

鼻炎用点鼻薬

アレルギー性鼻炎などの鼻みず、鼻づまりに

新ナザロン® 点鼻薬

製品の特徴

鼻は二オイを感じるだけでなく、呼吸器の一部として重要な役割を果たしているだけに、早目の手当が大切です。

新ナザロン点鼻薬は、アレルギー性鼻炎などによる鼻みず、鼻づまり、くしゃみなどの不快な症状にすぐれた効果を現す点鼻薬です。また、定量スプレー式なので、一定量の薬液が鼻腔内に均一に広がります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。

- 1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- 3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- 4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 5) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること。

1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

2) 3日間位使用しても症状がよくならない場合。

使用方法

1. キャップをとり、図のように容器を垂直に持ち先端部分を軽く鼻腔内に入れます。(鼻腔内を傷つけないように注意してください。)
2. 図のように容器を親指と人差し指・中指ではさむようにおさえ、それぞれ矢印の方向へ押し、スプレーします。
(使いはじめは、液が噴霧するまで数回押します。)
3. 鼻みずなどがついた時は、清潔な布などでふきとってください。



裏面に続く

成分分量 100mL中

成分	分量	はたらき
塩酸ナファゾリン	50mg	鼻粘膜の血管を収縮し、充血を取り除きます。
マレイン酸クロルフェニラミン	500mg	くしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどのアレルギー症状を抑えます。
塩化セチルピリジニウム	50mg	殺菌作用で化膿を防ぎます。
グリチルリチン酸二カリウム	300mg	鼻粘膜の炎症を抑えます。

添加物としてグリセリン、香料を含有する。

用法用量

次の1回量を1日6回を限度として、鼻腔内に噴霧する。

なお、適用間隔は3時間以上あけること。

年 令	1回量
成人（15才以上）	1～2度ずつ
7才以上 15才未満	
7才未満	使用しないこと

（用法用量に関連する注意）

- （1）過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがある。
- （2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- （3）点鼻用にはのみ使用すること。

効能効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の症状の緩和：

鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）
4. 他人と共用しないこと。
5. 表示の使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
（土・日・祝日を除く）



製造販売元
日水製薬株式会社
東京都台東区上野3-23-9