

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鼻炎用点鼻薬

医薬品

新ピロヘラー[®]点鼻薬

鼻みず、鼻づまりに効く

急性鼻炎のように鼻粘膜に炎症がおきると、毛細血管が拡張して充血し、分泌が異常になって、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどを引き起こしますが、比較的軽い症状であっても、鼻は感覚が鋭いために非常に不快なものです。

新ピロヘラー点鼻薬は噴霧することにより、鼻腔の奥深くまで薬液を浸透させ、患部に作用して、鼻みず、鼻づまりなどの症状を改善し、不快な症状を除きます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- (2) 3日間位使用しても症状がよくなる場合

効能又は効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重

用法及び用量

次の1回量を鼻腔内に噴霧してください

なお、3時間以上の間隔をおいて、1日6回まで使用できます

年 齢	1 回量
成人（15才以上）	1～2度ずつ
15才未満	使用しないこと

裏面につづく

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください
- (2) 過度に使用しますと、かえって鼻づまりを起こすことがあります
- (3) 点鼻用にのみ使用してください

新ピロヘラー点鼻薬の使い方



- * 容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにして使用してください
- * 噴霧した後、鼻腔内に容器の先端を入れたまま押している指の力をぬきますと、鼻みず等が容器内に吸い込まれて、薬液が汚染される原因になります
- * 使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等でふきとり、キャップをしてください
- * 容器の中に少量の薬液が残りますが、残量を見込んで充填しています

成分及び分量

15mL中に次の成分を含んでいます

成 分	含 量	はたらき
塩酸ナファゾリン	7.5mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻の通りを改善します
マレイン酸クロルフェニラミン	15mg	抗ヒスタミン作用により、花粉などによるアレルギー性のくしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどの症状をおさえます
塩化ベンゼトニウム	1.5mg	鼻腔内に付着した細菌に対し、殺菌作用をあらわし、清潔にします

添加物として、塩化Naを含有しています

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 他の人と共用しないでください
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください

包装 15mL

本製品についてのお問い合わせ先

- ・ お買い求めのお店
- ・ 日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：(03)3370-7174
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）