

生薬エキス散

清気散

第②類医薬品

- ☆清気散は、炎症やはれをおさえ、局所の水分偏在を調整し、鼻づまりを改善するとともに、鼻炎なども鎮めます。
- ☆働きの異なる多くの生薬の組み合わせで、鼻病に因づく頭重、倦怠に効果があります。
- ☆服用しやすい、携帯に便利なアルミ分包包装です。



使用上の注意



してはいけないこと


(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

＊＊1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
食欲不振、吐き気・嘔吐、軟便、下痢、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- (10) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)



＊＊2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌 尿 器	排尿障害

＊＊3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢

＊＊4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

鼻炎、鼻力タル、蓄膿症、副鼻腔炎、鼻づまり、鼻病に因づく頭重・倦怠

用法・用量

次の量を、食間に、水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人	1 包	3 回
8歳～15歳	1／2 包	
4歳～7歳	1／3～1／2 包	
2歳～3歳	1／4～1／3 包	
2歳未満	服用しないこと	

服用時間を守りましょう。

食間：食後2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

服用方法



①最初に口の中に
少しの水やぬる
ま湯をふくんで
ください。



②アルミをやぶっ
て、薬を口の中
にふくみます。



③水やぬるま湯を
口にふくんで、
薬と一緒にのみ
ほします。



④もう一度、水や
ぬるま湯で口の中
をゆすぐよう
にします。

成分・分量

1包1.5g・20包中に次の生薬より製したエキス25.0g含有しています。

成 分	分 量	成 分	分 量	成 分	分 量
カッコン	14.0g	サイシン	3.0g	シンイ	4.0g
マオウ	10.0g	ゴミシ	4.0g	ケイガイ	3.0g
ショウキョウ	4.0g	ハンゲ	4.0g	レンギョウ	4.0g
タイソウ	5.0g	サイコ	5.0g	サンシシ	5.0g
ケイヒ	5.0g	オウゴン	5.0g	センキュウ	5.0g
シャクヤク	7.0g	キキョウ	5.0g		
カンゾウ	5.0g	ダイオウ	3.0g		

添加物としてセルロース、水酸化Alを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を
折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



その他

本剤は生薬を用いた製品ですから、製品により色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15 電話 (078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1