

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

つらい鼻炎 鼻づまりに 清気散

生薬製剤

第②類医薬品

販売名：清気散

**ぐずぐず長引く鼻水や
つらい鼻炎・鼻づまりの
出どころにしっかり
効きます。**

清気散(セイキサン)は19種類の生薬の組み合わせで、鼻づまりを改善するとともに鼻炎なども鎮めます。また、鼻病による頭が重く感じる症状やだるさにも効果があります。携帯に便利なアルミ分包包装です。

**鼻炎の原因に
はたらきかける**

ケイガイ、レンギョウ、サイシンなど10の生薬

鼻の炎症を抑える

カンゾウ、キキョウ、マオウなど10の生薬

**鼻粘膜の腫れを収縮し
鼻づまりを改善**

シンイ(生薬)

飲み方アドバイス

- ◎多めの温かいお湯で服用いただくとより効果的です。
- ◎最初に水やぬるま湯を口に含んで、薬を入れると飲みやすくなります。



和漢のチカラを科学し、あなたへ。～摩耶堂製薬～

漢方薬に日本の生薬「和薬」等を配合したものを「和漢薬」といい、日本人の体質に合わせて心身の不調をお手当することを目指しています。『摩耶堂製薬』のお薬は、和漢薬にさらに独自の工夫を加え、カラダの内側から効き目を現す処方です。現代社会がもたらす様々な心身の不調を整え、あなたの本来の健やかさを。摩耶堂製薬の想いです。



使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)



授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: 食欲不振、吐き気・嘔吐、軟便、下痢、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病 (10) 次の医薬品を服用している人: 瀉下薬 (下剤)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌尿器	排尿障害

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。軟便、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 鼻炎、鼻カタル、蓄膿症、副鼻腔炎、鼻づまり、鼻病に因づく頭重・倦怠

【用法・用量】 次の量を食間に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人	1包	3回
8歳～15歳	1/2包	
4歳～7歳	1/3～1/2包	
2歳～3歳	1/4～1/3包	
2歳未満	服用しないこと	

服用時間を守りましょう。

食間：食後2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 1包1.5g・20包中に次の生薬より製したエキス25.0gを含有しています。

カ ッ コ ン …… 14.0g	シャクヤク …… 7.0g	サ イ コ …… 5.0g	ケ イ ガ イ …… 3.0g
マ オ ウ …… 10.0g	カンゾウ …… 5.0g	オウゴン …… 5.0g	レンギョウ …… 4.0g
ショウキョウ …… 4.0g	サイシン …… 3.0g	キキョウ …… 5.0g	サンシシ …… 5.0g
タイソウ …… 5.0g	ゴ ミ シ …… 4.0g	ダイオウ …… 3.0g	センキュウ …… 5.0g
ケ イ ヒ …… 5.0g	ハ ン ゲ …… 4.0g	シ ン イ …… 4.0g	

※添加物としてカルメロースCa、無水ケイ酸を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】 本剤は生薬を用いた製品ですから、製品により色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

お問い合わせ先：摩耶堂製薬株式会社「くすりの相談室」 電話：(078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元



摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1
http://www.mayado.jp

