

この添付文書は、使用前によくお読みください。
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

第3類医薬品

のどの荒れと痛みに コフジスのどスプレー



のどのあれ、痛み、はれ、不快感、声がれの症状は、かぜなどからの細菌感染によりのどに炎症を起こしたときに現れます。また、空気中のホコリ、花粉や排気ガス等の汚れた空気の吸い込み、タバコの吸い過ぎの他にカラオケでのどの使い過ぎなどによっても起こります。

こんなときにミントの香りのコフジスのどスプレーは、さわやかなミントの香りが口中に広がり、のどの炎症をおさえ、荒れたのどを正常なまでの状態に戻してくれます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 次の症状のある人。

口内のひどいただれ

(3) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

のどの炎症によるのどあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ


【用法・用量】

1 日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いてください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) のどの塗布用のみ使用し、内服しないでください。
- (4) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、噴射口をのどの患部に向けて、声を出しながら噴射してください。
- (5) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

＜容器の使用方式＞



【成分・分量】

100mL中 ポビドンヨード……0.45g

添加物として、ヨウ化K、グリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトール液、l-メントール、アルコール、香料を含有します。

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 携帯する時は、必ずキャップをして衣類等に付着しない様に注意してください。
- (5) 薬液がこぼれて衣類などに付着した時は、すぐに水または洗剤で洗ってください。
- (6) 火気に近づけないでください。
- (7) 噴射口を針等で突つかないでください。
- (8) キャップをしたまま噴射すると、キャップが口の中に入ることがありますので、必ずキャップを取ってから噴射してください。
- (9) 最初にご使用になるときは液が出るまで空押しを行ってください。
- (10) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL: 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元 **リブ・ラボラトリーズ株式会社**

東京都文京区音羽2-1-4

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824 AKW1