

# のどの痛み 殺菌・口臭

# シンピタ<sup>®</sup> トローチ

医薬部外品

## 【効能・効果】

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ

## 【用法・用量】

大人（15歳以上）及び5歳以上の小児1回2粒、1日3～6回、1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用する。2時間以上の間隔をおいて使用する。

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 2) かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

販売元：日邦薬品工業株式会社

東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台



協和発酵グループ

発売元：伸和製薬株式会社

東京都中央区日本橋蛸殻町1-29-1

電話：03(3639)9771



製造販売元：高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10



## 【成分・分量】12粒中

塩化セチルピリジニウム（口内殺菌成分）6mg、グリチルリチン酸二カリウム（消炎成分）15mg、キキョウ流工キス1,200mg

添加物として白糖、水アメ、銅クロロフィリンナトリウム、1-メントール、グリセリン脂肪酸エステル、香料、プロピレングリコール、フェニルエチルアルコールを含有する。

## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

- 1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れかえないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）