

# のどの痛み 殺菌・口臭

# シンピタ<sup>®</sup> トローチ

医薬部外品

## 【効能・効果】

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

## 【用法・用量】

大人(15歳以上)及び5歳以上の小児1回2粒、1日3~6回、1粒ずつ2粒までを口中に含み、かますにゆっくり溶かして使用する。2時間以上の間隔をおいて使用する。

## 〈用法・用量に関する注意〉

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 2) かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

販売元： 日邦薬品工業株式会社  
東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台



プラスコ印

発売元： 伸和製薬株式会社  
東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-1  
電話： 03(3639)9771



製造販売元： 高市製薬株式会社  
奈良県高市郡明日香村野口10

## 【成分・分量】

12粒中  
塩化セチルピリジニウム(口内殺菌成分)6mg、グリチルリチン酸二カリウム(消炎成分)15mg、キキョウ流エキス1,200mg

添加物として白糖、水アメ、銅クロロフィリンナトリウム、L-メントール、グリセリン脂肪酸エステル、香料、プロピレングリコール、フェニルエチルアルコールを含有する。

## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
  - 1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 2) 本人又は家族がアレルギー体质の人。
  - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
  - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

- 2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)