

のどの痛み 殺菌・口臭

シンピタ[®] トローチ

指定医薬部外品

【効能・効果】

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

大人(15歳以上)及び5歳以上の小児1回2粒、1日3～6回、1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用してください。2時間以上の間隔をおいて使用してください。なお、5歳未満の乳幼児は使用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 2) かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

販売元: 日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



発売元: 伸和製薬株式会社

東京都中央区日本橋蛸殻町1-29-1
電話: 03(3639)9771

製造販売元: 高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10

使用に際しては、この説明文書をよく読んでください。

【成分・分量】12粒中
セチルピリジニウム塩化物水和物(口内殺菌成分)6mg、
グリチルリチン酸二カリウム(消炎成分)15mg、キキョウ流エキス1,200mg
添加物として白糖、水アメ、銅クロロフィリンナトリウム、
L-メントール、グリセリン脂肪酸エステル、香料、プロピレングリコール、フェニルエチルアルコールを含有する。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)