

この説明書を服用する前に必ずよくお読みください。
また、必要なときに読めるようお薬と共に保管してください。

のどの痛み・あれ・声がれに

のどスプレー ジェントルスロートA



ポビドンヨード製剤

- **のどスプレー ジェントルスロートA** は、
有効成分ポビドンヨードをのどの患部に直接噴射する『のど用治療薬』です。
- 風邪やタバコの吸い過ぎ、汚れた空気の吸入が原因でのどの痛みや荒れ・不快感・声がれを起こします。このような症状の折に直接のどの患部にポビドンヨード製剤を噴射塗布することにより症状をやわらげ、またさわやかなミントの香りがこちよくお口の中にひろがる新しい型の、のど用治療薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

「守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります。」

1. 次の人は使用しないでください
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (2) 授乳中の人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 本剤又はヨードに対して過敏症の既往歴のある人。
 - (6) 次の症状のある人
口内のひどいただれ。
 - (7) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

その他の注意

1. 使用の際、次のことに注意してください。
 - (1) 定められた用法・用量を守ってください。
 - (2) 本剤はのどの患部への噴射塗布にのみ使用してください。(内服用ではありません。)
 - (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
 - (4) 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
 - (5) 乳幼児への使用はなるべくおさげください。
 - (6) 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。
 - (7) 長期連用しないでください。

■ 効能・効果


のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ。

■ 用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いてください。

※2 ■ 使用方法

- (1) 息を吸いながら使用すると薬液が気管支や肺に入りますので、ノズルをのどの患部に向けて声を出しながら（息を吐きながら）2～3回噴射してください。
- (2) 1回2～3噴射を目安に1日に数回程度で使用下さい。



- (3) 低温では液が出にくくなる事があります。常温でご使用ください。

■ 成分・分量

1mL中 ポビドンヨード…………… 4.5mg
添加物として、ヨウ化K、グリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトール、L-メントール、香料、アルコールを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 高温・直射日光をさけて保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 薬剤がこぼれて衣類等に付着したら、すぐに水又は洗剤で洗ってください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。
- (7) 携帯する時は、必ずキャップをして添付のグリーンの袋に入れ、しっかりと封をしてください。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



ノズルやノズルの先端をむりに引っ張るととれる場合がありますので、むりに引っ張らないでください。



ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。



※携帯する時は液もれを防ぐためキャップをしっかりとめ、添付のビニール袋に入れ、しっかりと封をしてください。

■お問い合わせ先

本剤をご使用になられて、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願いいたします。

東洋化学株式会社

TEL (0748) 52-5780 (代)

受付時間 9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

※1 製造販売元

東洋化学株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008番地

包装 30 mL ノンガスタイプ

医薬品

SK05F