

口臭除去・口腔内殺菌
トローチ

チルド
フレッシュ



RHC
Real Health Care

かまずにゆっくり溶かしましょう。

指定医薬部外品 24錠入り

販売元：株式会社リアルネット

東京都品川区西五反田3-6-33 井門西五反田ビル3F

お客様相談窓口：0120-917-948

製造販売元：日新薬品工業株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

使用期限

製造番号



販売名：トローチS

使用に際しては、説明書をよくお読みください。

指定医薬部外品

▲ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- のどの炎症による次の症状：のどの痛み・のどのほれ・のどのあれ・声がれ・のどの不快感
- 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

【用法・用量】

次の1回量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
5歳以上	1錠	6回	2時間以上
5歳未満の乳幼児	使用しないでください。		

＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
- 本剤は、5歳未満の乳幼児には使用させないでください。
- トローチ剤の取り出し方
トローチ剤の入っている PTP シート凸部を指先で強く押し、裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



【成分・分量】1錠(1.2g)中

成分	分量
セチルピリジニウム塩化物水和物	1mg
キキョウエキス（原生薬換算量）	25mg(100mg)

添加物：精製白糖、脱脂粉乳、初末還元麦芽糖水アメ、ゼラチン、マクロゴール6000、ポリドン、ステアリン酸カルシウム、黄色5号、1-メントール、プロピレングリコール、アラビアゴム、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 本剤は吸湿性をもっています。アルミ袋を開封し、日数を経ると湿気の多いときは、変色することがあります。ご使用の残りは、特に湿気に注意し、変色したものは、使用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。