

製品の品質を確保し、お買い上げの際は必ずお薬師様にお買いいただきます  
**小林製薬 お客様相談室**  
**0120-5884-06**  
 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)  
 〒541-0045 大阪市中央区京橋4-4-2  
**小林製薬株式会社**  
 〒110-8555 東京都港区新橋2-1-1  
**小林製薬株式会社**

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(箱側面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

**指定医薬部外品** 口腔咽喉薬  
 Medicine for Oral Disinfectant  
**販売名: トローチS**

**△ 使用上の注意**

**★ (相談すること)**

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能・効果】** のどの炎症による次の症状：のどの痛み・のどのはれ・のどのおれ・声がれ・のどの不快感。口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

**【用法・用量】** 大人(15才以上) 1回1錠、11才以上15才未満1回1錠、8才以上11才未満1回1錠、5才以上8才未満1回1錠を2時間以上の間隔をおいて、1日6回口中に含み、かますにゆっくり溶かしてください(5才未満は使用しないこと)

**<用法・用量に関連する注意>**

(1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (3) かみ砕いたり、のみ込んではいけません

**【成分・分量】** 1日量(6錠)中  
 セルピリジニウム塩化物水和物(CPC)6mg  
 キョウエキス150mg(原生葉換算量600mg)  
 添加物として、白糖、還元麦芽糖水アセス、無水ケイ酸、ゼラチン、アラビヤガム、パラベン、ステアリン酸Ca、黄色5号、香料を含有する

**【保管及び取扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 1度アルミ袋を開封した後、使用した残りの薬剤は特に湿気に注意し、変色したものは使用しないこと

押して開ける

**<トローチの取り出し方>** 図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用すること  
**おしだす↓**  
 (誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる)



MADE IN JAPAN 10195213

**気になる時にお口を殺菌・消毒**

**のどぬ~る どのどでも殺菌トローチ**



**気になる時にお口を殺菌・消毒**

**のどぬ~る**

**どのどでも殺菌トローチ**



殺菌成分  
**CPC** 配合



水なし  
 そのまま



小林製薬

12錠入 指定医薬部外品

スイートミント味

