

口腔内の殺菌・消毒に

医薬品

口腔咽喉薬

トローチゴールド

トローチゴールドは、塩化セチルピリジニウム、塩化リゾチーム、キキョウエキスを配合したトローチ剤で、口の中でなめらかに溶け、のどの痛み・はれ・声がれ、口腔内の殺菌・消毒及び口臭の除去など、のどの不快な症状に優れた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 5歳未満の乳幼児。
- (2) 今までに、薬や鶏卵によるアレルギー症状（たとえば発熱、発疹、関節痛、ぜんそく、かゆみ等）を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

- 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
- のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

次の1回量を、口中に含み、かますにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1 回 量	1 日 使 用 量	使 用 間 隔
5 歳以上	1 錠	6 回	2 時間以上
5 歳未満の乳幼児	使用しないでください。		

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
- (4) 本剤は5歳未満の乳幼児には、使用させないでください。
- (5) トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシート凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



【成分・分量と作用】

1 日 量〔6 錠(1 錠：1.2g)〕中

成 分	分 量	作 用
塩化セチルピリジニウム	6mg	殺菌作用をもち細菌の感染を予防します。
塩化リゾチーム	36mg (力価)	のどの粘膜に作用し、周辺の組織を強化し、修復を促進します。それによって消炎・感染予防の働きをします。
キキョウエキス	150mg (原生薬換算量：600mg)	気道の粘液分泌を増加させます。

添加物として、還元麦芽糖水アメ、精製白糖、ゼラチン、マクロゴール6000、黄色5号、ポビドン、ステアリン酸カルシウム、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤は吸湿性をもっています。アルミ袋を開封し、日数を経ると湿気の多いときは、変色することがあります。ご使用の残りは、特に湿気に注意し、変色したものは、使用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

TEL：0748-52-2323

受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)