

この添付文書は本剤とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

噴射式口腔咽喉薬

のどの荒れと痛み

フィンツシュー

フィンツシューは、かぜだけでなくタバコの吸い過ぎや汚染空気の原因で起こる、のどの痛みや不快感などにすぐれた効果を発揮する噴射式ののど治療薬です。のどの患部にピュッピュッと噴射しますと、効きめの成分が患部に直接当たり、のどを正常な状態に治してくれます。

- タバコや汚染空気の吸入で荒れてしまったのどが気持ちよく治ります。
- のどに炎症をおこすかぜ等の菌を直接退治してハレと痛みをとります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないこと

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 授乳中の人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

口中のひどいただれ

- (6) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心、吐気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いる。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ること。
- (2) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあるので、ノズルをのどの患部にむけて、ア〜ッと声を出しながら、ピュッピュッと2～3回直射すること。

- (3) 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 塗布にのみ使用すること。



＜容器の正しい使い方＞


■この容器はポンプストッパーがついており、ノズルを反対方向にまわさないと、液が出ないようにになっています。

1



まず、このままの状態です、必ずキャップをはずす。

2



ノズルを反対方向にまわすと、ポンプが作動状態になる。

3



頭部を押しながら、液を患部に2～3回直射する。

4



使用後はノズルをもとの位置にもどし、しっかりキャップをはめる。

※最初にお使いになるときは、液が出るまで4～5回押してください。

※ノズルがもとの位置にもどっていなかったり、キャップがしっかりとまわっていないと、キャップがはずれたり、液もれするおそれがありますので注意してください。

成分・分量(1mL中)

ポピドンヨード 4.5mg

〔添加物〕L-メントール、ヨウ化K、グリセリン、エタノール

＜成分・分量に関連する注意＞


本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤が衣類や寝具などに付着した時は、なるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと。
- (5) プラスチック類、塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意すること。
- (6) 火気に近づけないこと。
- (7) 液が出なくなったり、不衛生になるので、キャップをしっかりはめ、ゴミが付着しないようにすること。
- (8) キャップをしたまま噴射すると、キャップを飲みこむおそれがあるので、必ずキャップをとってから噴射すること。
- (9) 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないこと。



フィニッシュコーワを携帯する時は、添付のグリーン袋に入れてください。



本製品に関するお問い合わせは
 興和株式会社 医薬事業部 くすり相談室へお願いします。
 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
 TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
 電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14