

噴射式口腔咽喉薬

のどの荒れと痛みに

フィニッシュ

フィニッシュは、かぜだけでなくタバコの吸い過ぎや汚染空気の入りが原因で起こる、ノドの痛みや不快感などにすぐれた効果を発揮する噴射式のノド用治療薬です。ノドの患部にピュッピュッと噴射しますと、効きめの成分が患部に直接当たり、ノドを正常な状態に治してくれます。

- タバコや汚染空気の吸入で荒れてしまったノドが気持ちよく治ります。
- ノドに炎症をおこすかぜ等の菌を直接退治してハレと痛みをとります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(2) 授乳中の人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
口中のひどいただれ
(6) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心、吐気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦し 等があらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

成分・分量 (1mL中)

ポビドンヨード 4.5mg

[添加物] l-メントール、ヨウ化K、グリセリン、エタノール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

用法・用量

1 日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルの患部にむけて、ア〜ッと声を出しながら、ピュッピュッと2〜3回直射してください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 塗布にのみ使用してください。



＜容器の正しい使い方＞

■この容器はポンプストッパーがついており、ノズルを反対方向にまわさないと、液が出ないようにになっています。

1




まず、このままの状態
で、必ずキャップ
をはずしてください。

2




ノズルを反対方向に
まわすと、ポンプが
作動状態になります。

3



頭部を押しながら、
液を患部に2〜3回
直射してください。

4



使用後は、ノズルをも
との位置にもどして
からキャップをはめて
ください。

※最初にお使いになるときは、液が出るまで4〜5回押してください。

※ノズルがもとの位置にもどっていなかったり、キャップがしっかりはまっていないと、キャップがはずれたり、液もれするおそれがありますので注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤が衣類や寝具などに付着した時は、なるべく早く水が洗剤で洗い落としてください。
- (5) プラスチック類、塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 火気に近づけないでください。
- (7) 液が出なくなったり、不衛生になるので、キャップをしっかりとめ、ゴミが付着しないようにしてください。
- (8) キャップをしたまま噴射すると、キャップを飲みこむおそれがありますので、必ずキャップをとってから噴射してください。
- (9) 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



フィニッシュコーワを
携帯する時は、
添付のグリーンの袋に
入れてください。



本製品に関するお問い合わせは

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月〜金(祝日を除く)9:00〜17:00



製造販売元

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

