

使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

噴射式口腔内消炎薬

のどの痛み・はれに
ジェルタイプ

ルルスプラッシュ

《ルルスプラッシュ》は、

- かぜなどによるのどの痛み・はれを抑えます。
- ジェルが患部に付着して効果を発揮します。
- 水溶性アズレンの薬効とL-メントールの清涼感が、のどを爽やかにします。

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
次の症状のある人
口内のひどいただれ
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
□	刺激感
 - 5～6日間使用しても症状がよくならない場合


適 応 症

- のどの炎症によるのどの痛み・のどのあれ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ
- 口内炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布して下さい。

- ①キャップをはずし、ノズルをのどに向けて2～3回噴射して下さい。
なお、初回使用時は、液が出るまで4～5回押して下さい。
- ②使用後はしっかりキャップを閉めて下さい。



〈用法・用量に関連する注意〉

1. 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、声を出しながら噴射して下さい。
2. 定められた用法を厳守して下さい。
3. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
4. 目に入らないよう注意して下さい。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、眼科医の診療を受けて下さい。

■ 成分と作用

100g中

成 分	含 量	作 用
アズレンスルホン酸ナトリウム (水溶性アズレン)	0.02g	あれたのどの炎症をしずめ、 のどを正常に回復します。

添加物：L-メントール、塩化ベンゼトニウム、グリセリン、プロピレングリコール、
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、エデト酸
Na (ナトリウム)、ステビア、塩化Na (ナトリウム)、pH調節剤

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店
又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2

電話 03(6667)3232

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

03 登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町36-2

製造販売元

東興薬品工業株式会社

富山県中新川郡立山町辻20