

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

噴射式口腔内消炎薬

第3類医薬品

のどの痛み・はれに
ジェルタイプ

ルルスプラッシュ

《ルルスプラッシュ》は、

- かぜなどによるのどの痛み・はれを抑えます。
- ジェルが患部に付着して効果を発揮します。
- 水溶性アズレンの薬効とL-メントールの清涼感が、のどを爽やかにします。

！ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
次の症状のある人
□内のひどいだけ
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
□	刺激感
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合


■ 効能・効果

- のどの炎症によるのどの痛み・のどのあれ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ
- 口内炎

■ 用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布して下さい。

- ①キャップをはずし、ノズルをのどに向けて2～3回噴射して下さい。
なお、初回使用時は、液が出るまで4～5回押して下さい。
- ②使用後はしっかりキャップを閉めて下さい。



＜用法・用量に関連する注意＞

1. 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、声を出しながら噴射して下さい。
2. 定められた用法を厳守して下さい。
3. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
4. 目に入らないよう注意して下さい。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、眼科医の診療を受けて下さい。

■ 成 分

100g中

成 分	含 量	作 用
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン)	0.02g	あれたのどの炎症をしずめ、 のどを正常に回復します。

添加物：L-メントール、ベンゼトニウム塩化物、グリセリン、プロピレングリコール、
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、エデト酸
Na、ステビア抽出物、塩化Na、pH調節剤

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が
変わります。）。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03 (5205) 8331

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

07®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

東興薬品工業株式会社

富山県中新川郡立山町辻20