

使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

指定医薬部外品

口腔咽喉薬

のどの痛み・のどのはれ・声がれに

新ジキナトローチ[®] (生薬エキス配合)

◆ **新ジキナトローチ** は、口内殺菌成分のセチルピリジニウム塩化物水和物と、のどに良い生薬キキョウエキスを配合したトローチ剤で、口内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの痛み・のどのあれ・声がれに効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効 能・効 果

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用 法・用 量

次の1回量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1 回 量	1 日 使用 回数
5 才 以 上	1 錠	3～6 回 使用間隔は 2 時間以上あけること
5 才 未 満	使用しないこと	

裏面もお読みください。


<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) かみくだいたり、そのままのみ込んだりしないでください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

成 分・分 量 1錠中

成 分	含 量	は た ら き
セチルピリジニウム 塩化物水和物	1.0mg	口内を殺菌・消毒し、のどのあれ、 口臭を抑えます。
キキョウ乾燥エキス	22.2mg (原生薬換算量 : 100mg)	のどの炎症を抑え、のどの痛み、 のどのはれ、のどの不快感、声がれ に効果があります。

添加剤：グリセリン、ポビドン、アラビアゴム、ステアリン酸Ca、マクロゴール、脱脂粉乳、白糖、黄色5号、l-メントール、香料 含有

外 形	直径 (mm)	重量 (g)
	17 mm	1.2 g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

<錠剤の取り出し方>

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

<PTPシートの取り出し図>



お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)

電話 (048) 648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地