

ご使用に際して、説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

龍角散ののどスプレー＊第3類医薬品 新ノドトフル

口腔咽喉薬

龍角散ののどスプレー新ノドトフルは、患部に直接噴射塗布することで、主成分のポビドンヨードがのどの炎症を起こす原因菌を殺菌し、痛みやはれを緩和します。

特長 ●ポビドンヨードがのどの炎症を起こす原因菌を殺菌します。

●携帯に便利なスリムボトルです。

●さわやかなフレッシュミント味です。



使用上の注意



してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり
副作用が起こりやすくなります

1. 次の人は使用しないでください。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(2) 授乳中の人

(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人

(4) 薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 次の症状のある人：口内のひどいただれ

(6) 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮膚	じんましん、発疹
消化器	悪心、吐気
その他	胸苦しさ、むくみ、不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
ショック(アナフィラキシー)：使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどののはれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量

1日数回、適量をのどの粘膜面に噴射塗布する。

※ご使用前後に、液剤が衣服等へ付着しないよう
ご注意ください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部に向けて、声を出しながら噴射してください。
- (3) のどの噴射塗布のみに使用してください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、ただちに眼科医の診療を受けてください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

〈その他の注意〉

- (1) 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。
- (2) 使用後にノズルの部分に液が付着した時は、清潔な布等でふいてからキャップをしてください。

成分・分量 1mL中

成分	含量
ボピドンヨード	4.5mg

添加物: ヨウ化K、グリセリン、エタノール、ℓ-メントール

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 薬液がこぼれ衣類等に付着した場合、水又は洗剤で洗ってください。
- (5) ポンプの機能上、使い始めは液が出るまでに4~5回空押しが必要です。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問合わせ先

お客様相談室



株式会社 龍角散

電話/03-3866-1326

時間/10:00~17:00

(土・日・祝日を除く)

✕モ

購入店など記入してください。

発売元



株式会社

龍角散

東京都千代田区東神田2-5-12

製造販売元 合名会社 東宝製薬

岐阜県岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地