

この説明書は、本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

口腔内殺菌消毒薬

第3類医薬品

荒れたのど粘膜に直接効果！ 浅田飴 のどクールスプレー

⚠ ご使用上の注意

してはいけないこと ❌

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。】

1. 次の人は使用しないでください。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (5) 授乳中の人
- (6) ヨードに対して過敏症の既往歴のある人
- (7) 次の症状のある人 口内のひどいただれ
- (8) 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	悪心
そ の 他	不快感、吐気

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

【用法・用量】

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- のどの塗布用のみ使用してください。
- ノズルをのどの患部に向けて、アーッと声を出しながら噴射してください。（息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります。）
- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

＜使用方法＞

①  キャップをはずしてください。 ※最初は液が出るまで空押しを行ってください。	②  ノズルは回転できます。	③  ノズルの先端を患部に向けて、噴射塗布してください。 ※吸入しないようにアーッと声を出しながら噴射してください。	④  使用後はきちんとキャップをはめて保管してください。
---	---	---	--

【成分・分量】100ml中

ポピドンヨード 0.45g

添加物としてヨウ化K、DL-リンゴ酸、グリセリン、*l*-メントール、エタノール、香料含有

- 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変化します。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 薬液がこぼれ衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社浅田館 お客様相談室

電話 03-3953-4044（ダイヤルイン）

時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用救済制度は、医薬品を正しく使用したにもかかわらず、入院を必要とする程度の副作用が生じた場合に医療費等の救済給付が行われる制度です。

内容量 30ml ノンガスタイプ

発売元 **株式会社浅田館**
東京都東村山市久米川町5-29-7

製造販売元 **ジャパンメディック株式会社**
富山県富山市横越168