

Meiji

1

炎症を
抑える

+

2

殺菌

=

ダブルの
効き目

のどの殺菌
のどの痛み・はれに



明治
Gトローチ

医薬部外品

24個

くすり相談室(03)3273-3474 9時～17時(土、日、祝日を除く)

■ 効能・効果

のどの殺菌・消毒、口臭の除去
のどの炎症による声がれ・のどのあれ・
のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ



注意:使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

明治Gトローチ 医薬部外品 **24個**

■ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

■ 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)

■ 成分・分量 1個中

塩化セチルピリジニウム 1mg、グリチルリチン酸二カリウム 2.5mg、キキョウエキス 20mg (原生薬換算量 80mg) ●添加物:白糖、ゼラチン、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、パラベン、黄色5号、香料、L-メントール

■ 用法・用量

成人(15歳以上) 1回1個を1日6回、5歳以上15歳未満1回1個を1日3回、いずれも2時間以上の間隔をおいて口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

<用法・用量に関連する注意> (1) かみ砕いたり、飲み込んだりしないこと。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) トローチの取り出し方: 下図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用すること。(誤ってそのまま飲み込んだりすると <PTPシートの取り出し図> 食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



製造番号 MGTBL

使用期限

製造販売元



明治製菓株式会社
104-8002東京都中央区京橋2-4-16

開封口