2024年6月改訂(下線部)

第②類医薬品

口腔用外用薬

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

Dent·my·star®
デント・マイ・スター® シリーズ

【販売名】デンタルピルクリーム

◆デンタルピルクリームは、歯茎や唇などが腫れてつらい時に、指で患部に塗り込む塗擦タイプのお薬です。

◆抗炎症作用のある合成副腎皮質ホルモン・プレドニゾロンと、細菌感染を防ぐ殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を効果的に配合しており、歯肉炎、歯齦炎、口内炎、口唇炎、口角炎に優れた効果をあらわします。

⚠使用上の注意

⊠してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください。

(1)ヘルペス等の感染症が疑われる人。(症状を悪化させてしまうことがあります)

(2)1～2日間使用して症状の悪化が見られる人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
   (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
   (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
   (3)妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
口腔内	白斑(カンジダ感染症が疑われる)、患部に黄色い膿がある(細菌感染症が疑われる)
その他	アレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)

3. 5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

※なお、本品に含まれる緑～黒色粒子は添加物の銅クロロフィリンナトリウムです。品質上問題はございませんので安心してお使いください。

裏面もお読みください

効能・効果

歯肉炎、歯槽炎、口内炎、口唇炎、口角炎

用法・用量

1日数回、適当量を清潔な指先、又は脱脂綿につけて、患部に塗擦してください。

【チューブの穴のあけ方】
キャップを逆さにして、突起部を
チューブの先に強く押し当ててください。



〔用法及び用量に関連する注意〕
(1)定められた用法・用量を守ってください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)本剤は効能・効果に記載されている症状にのみ使用し、その他に使用しないでください。

成分・分量

(100g中)

成　分	含量	はたらき
プレドニゾロン	0.2g	患部の炎症をおさえます。
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.1g	患部を殺菌し、化膿を防ぎます。

添加物として、銅クロロフィリンナトリウム、ポビドン、流動パラフィン、クエン酸水和物、ゲル化炭化水素、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。
森下仁丹株式会社〔お問合せ先〕 0120-181-109
受付時間　平日9:00～21:00(土、日、祝日9:00～17:00)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構 0120-149-931
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

発売元　森下仁丹株式会社
大阪市中央区玉造1-2-40

製造販売元　万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142