

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

新今治水[®]

第2類医薬品

液剤タイプの「新今治水」は、カンフェニック処方（カンフル・フェノール・アルコールの配合）を応用してつくられた歯痛のお薬です。歯の痛いところに直接作用して、すみやかに痛みを鎮めます。

ご使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の部位には使用しないでください。

歯ぐき、唇



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - （2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ


3. 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能

むし歯・浮歯・歯の根の痛みを鎮める。

用法・用量

薬剤をしみ込ませた綿球を、むし歯の穴に押し込んでください。



《用法・用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法をおまもりください。
- (2) 痛みのある歯の空洞以外の箇所には塗布しないでください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
- (4) 本剤は歯科用にのみ使用し、眼科用その他に使用しないでください。

- (5) 本剤は歯の硬歯質(エナメル質・象牙質)を傷めませんが、歯以外のところに余分についた場合には一時的に食味などを変化させることがあるのでガーゼ等でふきとってください。
- (6) 誤って口のまわりや顔などについた場合は、ただちに水でよく洗ってふきとってください。

※本剤は、むし歯など歯の痛みの原因を治すことはできませんので、早めに歯科医師による根本的な治療をおすすめします。

成分・分量(100g中)

成分	含量	作用
チョウジ油	0.3 g	痛みを鎮めます。
フェノール	5.0 g	痛みを鎮め、殺菌します。
dl-カンフル	10.0 g	痛みを鎮めます。
ケイヒ油	2.5 g	
l-メントール	0.1 g	
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	炎症を抑えます。
ジブカイン塩酸塩	0.1 g	痛みを鎮めます。
塩酸パラブチルアミノ安息香酸ソエチルアミノエチル	0.03g	
サンシシチンキ	15.07g	炎症を抑えます。

添加物としてプロピレングリコール、エタノールを含有。

●合成着色剤は使用していません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 火気に近づけないでください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

包 装

4mL

姉妹品

- 急な歯痛に……携帯に便利でつけやすい
ゲル状の **コジシイ Q**
- 痛みと発熱に……とんぷく処方ですぐれた
効き目の **コジシイ とんぷく**



丹平製薬株式会社

大阪府茨木市宿久庄2丁目7番6号
お客様相談室フリーダイヤル(0120)500-461
(9:00~17:00まで、土・日・祝日を除く)
<http://www.tampei.co.jp>