

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

□ 紫 湯

(生薬製剤)



使用上の注意



相談すること

1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感、下痢

(2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

咽喉、口内、口唇の瘡、荒れ、腫痛に良し

用法・用量

本品1袋を煎じる容器(鉄製のものは使用しない)に入れ、水550mL(約3合)を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	1日分の1／3量	3 回
7～15歳	成人の1／2量	
4～6歳	成人の1／3量	
2～3歳	成人の1／6量	
2歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 服用に際しては人肌程度に温めて服用してください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品1袋（18.9g）中、下記生薬を含有します。

ニンジン…1.0g	ショウマ …1.5g	カンゾウ …0.5g
サンシシ…1.0g	ショウキョウ…0.2g	セッコウ …1.0g
オウレン…2.0g	タイソウ …0.2g	ソウジュツ…1.0g
カロコン…1.5g	トウキ …1.5g	ボウフウ …1.0g
ジオウ …1.5g	ゴボウシ …1.0g	ボタンピ …1.5g
ケイガイ…1.0g	ブクリョウ …1.5g	

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7