

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

こう し とう
□ 紫 湯

（ 生 薬 製 剤 ）

- ◆「□紫湯」は咽喉、口内、口唇の瘡、荒れ、腫痛を改善するために、17 種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - （4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感、下痢
- 2 週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

咽喉、口内、口唇の瘡、荒れ、腫痛

用法・用量

本品 1 包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水 550mL（約 3 合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人 1 日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1 日分の 1 / 3 量	3 回
7 歳以上 15 歳以下	成人の 1 / 2 量	
4 歳以上 7 歳未満	成人の 1 / 3 量	
2 歳以上 4 歳未満	成人の 1 / 6 量	
2 歳未満	服用しないこと	

食間とは…
食後 2～3 時間を
指します。

＜用法・用量に関連する注意＞

- （１）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （２）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 1 包（18.9g）中、下記生薬を含有します。

ニ ン シ ン	----- 1.0g	カ ン ソ ウ	----- 0.5g	ショウキョウ	----- 0.2g
オ ウ レ ン	----- 2.0g	ソウジュツ	----- 1.0g	ト ウ キ	----- 1.5g
シ オ ウ	----- 1.5g	ポ タ ン ピ	----- 1.5g	ブクリョウ	----- 1.5g
シ ョ ウ マ	----- 1.5g	サ ン シ シ	----- 1.0g	セ ッ コ ウ	----- 1.0g
タイソウ	----- 0.2g	カ ロ コ ン	----- 1.5g	ポ ウ フ ウ	----- 1.0g
ゴ ボ ウ シ	----- 1.0g	ケ イ ガ イ	----- 1.0g		

添加物は含有していません。

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （２）小児の手の届かない所に保管してください。
- （３）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （４）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7