

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

③

うん けい とう
錠剤 溫 経 湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3)胃腸の弱い人。
 - (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：

月経不順、月経困難、こしけ(おりもの)、更年期障害、不眠、神経症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれ(手の湿疹・皮膚炎)

〔用法・用量〕

食前1時間、又は空腹時服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	5～6錠	3回

〔成分・分量〕(本品100錠中)

自社製別紙規格

日局	トウキ末	2.1g	日局	ハンゲ	2.9g	別紙規格 水製工キス 2.5g
日局	センキュウ末	2.1g	日局	バクモンドウ	3.8g	
日局	シャクヤク末	2.6g	日局	トウキ	2.4g	
日局	ケイヒ末	2.1g	日局	センキュウ	2.4g	
日局	ボタンピ末	2.1g	日局	シャクヤク	2.9g	
日局	ショウキヨウ末	0.6g	日局	ニンジン	1.5g	
日局	カンゾウ末	1.5g	日局	ケイヒ	2.4g	
別紙規格	ハンゲ末	2.6g	日局	ボタンピ	2.4g	
別紙規格	バクモンドウ末	3.5g	日局	ショウキヨウ	0.9g	
日局	ニンジン末	1.2g	日局	カンゾウ	1.8g	
別紙規格	ゴシュユ末	1.2g	日局	ゴシュユ	1.5g	
別紙規格	アキヨウ末	0.9g	局外生規	アキヨウ	1.2g	

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことがありますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10
電話：03-3957-2997
○受付時間：9:00～17:00(土、日、祝祭日を除く)

副作用被害救済制度の窓口先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10