使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

体力中等度以上の方のひきはじめのかぜ、鼻かぜに

ひきはじめのかぜに 〈水製抽出液葛根湯〉 眠くなる成分を含まない

カコナール

内服液

カコナールの特徴

- ●『カコナール』はひきはじめのかぜに良く効きます。
- ●『カコナール』は1回1本、1日3回の飲みきりタイプです。
- ●『カコナール』は漢方の原典である「傷寒論」に記載されている「葛根湯」の水製抽出液で、煎じ薬の製法を工業的に確立して品質を安定させ、更に飲みやすくした内服液です(エキス製剤ではありません)。
- ●『カコナール』には、眠くなる成分が含まれていません。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4)胃腸の弱い人
 - (5)発汗傾向の著しい人
 - (6)高齢者
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8)次の症状のある人
 - むくみ、排尿困難
 - (9)次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

リスパリスペッペ	のかにいいうしょ	01010000		
関係	部位	症	状	
皮	131	発疹・発赤、かゆみ		
消	化 器	活 悪心、食欲不振、胃部不快感		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこ わばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
、肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- *(2)1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合
- *3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい

能・効果 * 数

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、 頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用 法・用

次の量を食間に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しない	で下さい。

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)本剤は、本質的に沈殿を含んでいます。よく振ってから服用して下さい。

分・分

本品1日量90mL(30mL×3本)中

成 分	分 量	はたらき
葛根湯抽出液(下記生薬の水製抽出液)日局カッコン・・・・4g日局マオウ・・・・4g日局ケイヒ・・・・3g日局シャクヤク・・・3g日局カンゾウ・・・・2g日局ショウキョウ・・・1g	90mL	日局 カッコンから日局 ショウキョウまでの葛根湯を構成する生薬の水製抽出液が、ひきはじめのかぜ、鼻かぜ、頭痛等に効果を発揮します。

添加物:D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、エタノール

かぜの養生法

かぜをこじらせると合併症をおこして、からだの調子を大きくくずしてしまうこと が多々あります。保温・保湿に心掛け、消化のよい栄養豊富な食物をとり安静にして、 早めに治すことが大切です。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質 が変わります。)
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- (5) ビンをあけたら飲みきって下さい。
- (6) ビンをあけたまま保存しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室 〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

話 03(6667)3232

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

R登録商標



-三共ヘルスケア株式会社

製造販売元 新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269