

この添付文書は、本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

眠くなる成分を含まない
1日2回型液体かぜ薬
〈葛根湯抽出液製剤〉

カコナル[®]2

内服液

かぜの初期症状に1日2回服用

『カコナル2』はかぜの初期（ひきはじめ）の諸症状の緩和を目的として
1日2回の服用で効くように開発された液体のかぜ薬です。

特 長

漢方の原典である「傷寒論^{しょうかんろん}」に記載されている「葛根湯^{かっこんとう}」の水製抽出液です。葛根湯は漢方医学的にかぜの初期に用いられる代表的な薬で「煎じ薬」として用いられます。『カコナル2』はこの煎じ薬の製法を工業的に確立して品質を安定させた内服液です（エキス製剤ではありません）。「汗は出ていないが、肩・首筋のこわばりがあって、発熱して、悪寒（さむけ）がして頭痛がする。また、鼻水がでて、のどが痛い等」のかぜのひきはじめの症状がみられるときに、特に優れた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

成分・分量

本品1日量90mL(45mL×2本)中

成分	分量	はたらき
葛根湯濃縮液 (下記生薬の水製抽出液)	81mL	日局 カッコンから日局 ショウキョウまでの 葛根湯を構成する生薬の水製抽出液が、 かぜの初期の諸症状(発熱、寒け、頭痛、 肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの 痛み)に効果を発揮します。
日局 カッコン	8g	
日局 マオウ	4g	
日局 タイソウ	4g	
日局 ケイヒ	3g	
日局 シャクヤク	3g	
日局 カンゾウ	2g	
日局 ショウキョウ	1g	

添加物として、D-ソルビール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料(プロピレングリコール、エタノールを含む)を含有します。

効能・効果

かぜの初期の諸症状(発熱、寒け、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

用法・用量

次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないでください	

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

かぜの養生法

かぜをこじらせると合併症をおこして、からだの調子を大きくくずしてしまうことが多々あります。保温・保湿に心掛け、消化のよい栄養豊富な食物をとり安静にして、早めに治すことが大切です。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ビンをあけたら飲みきってください。
- (6) ビンをあけたまま保存しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電話 03(6667)3232
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269