

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

*：2010年3月改訂

第2類医薬品

体力中等度以上の方のひきははじめのかぜ、鼻かぜに

1日2回 液体タイプ
〈水製抽出液葛根湯〉
眠くなる成分を含まない

カコナール[®]2

内服液

カコナール2の特徴

- 『カコナール2』はひきははじめのかぜに良く効きます。
- 『カコナール2』は1回1本、1日2回の服用で優れた効果を発揮します。
- 『カコナール2』は漢方の原典である「傷寒論」^{しょうかんろん}に記載されている「葛根湯」^{かつこんとう}の水製抽出液で、煎じ薬の製法を工業的に確立して品質を安定させ、更に飲みやすくした内服液です（エキス製剤ではありません）。
- 『カコナール2』には、眠くなる成分が含まれていません。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

* (2) 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなり
ない場合

* 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい

* 効 能 ・ 効 果

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用 法 ・ 用 量

次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2〜3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)本剤は、本質的に沈殿を含んでいます。よく振ってから服用して下さい。

成 分 ・ 分 量

本品1日量90mL(45mL×2本)中

成 分	分 量	はたらき
葛 根 湯 濃 縮 液 (下記生薬の水製抽出液) 日局 カッコン……8g 日局 マオウ……4g 日局 タイソウ……4g 日局 ケイヒ……3g 日局 シャクヤク…3g 日局 カンゾウ……2g 日局 ショウキョウ…1g	81mL	日局 カッコンから日局 ショウキョウまでの葛根湯を構成する生薬の水製抽出液が、ひきはじめのかぜ、鼻かぜ、頭痛等に効果を発揮します。

添加物: D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、エタノール

かぜの養生法

かぜをこじらせると合併症をおこして、からだの調子を大きくくずしてしまうことが多々あります。保温・保湿に心掛け、消化のよい栄養豊富な食物をとり安静にして、早めに治すことが大切です。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- (5) ピンをあけたら飲みきって下さい。
- (6) ピンをあけたまま保存しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
 〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
 電 話 03(6667)3232
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

® 登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
 Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元
新生薬品工業株式会社
 奈良県高市郡高取町清水谷1269

F