

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

13

錠剤 きゅう ききょうがい どう 芍帰膠艾湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位（痔出血に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症：
痔出血、貧血、月経異常・月経過多・不正出血、皮下出血

〔用法・用量〕

食間又は空腹時に服用する。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|--------|------|--------|
| 大人 | 4～6錠 | 3回 |
| 7～13歳迄 | 2～3錠 | |

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本品100錠中）

| 自社製別紙規格 | | | | | | | |
|---------|--------|--------|------|-------|-------|----------------------|-------|
| 日局 | センキュウ末 | 2.50 g | 日局 | センキュウ | 3.0 g | 別水 紙性 規キ 格ス | |
| 日局 | カンソウ末 | 2.50 g | 日局 | カンソウ | 3.0 g | | |
| 日局 | トウキ末 | 3.75 g | 日局 | トウキ | 4.5 g | | |
| 日局 | シャクヤク末 | 3.75 g | 日局 | シャクヤク | 4.5 g | | |
| 局外生規 | ジオウ末 | 5.00 g | 日局 | ジオウ | 6.0 g | | |
| 別紙規格 | ガイヨウ末 | 2.50 g | 局外生規 | ガイヨウ | 3.0 g | | 2.5 g |
| 別紙規格 | アキヨウ末 | 2.50 g | 局外生規 | アキヨウ | 3.0 g | | |

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ，なるべく湿気の少ない，涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用をさけ，品質を保持するために，他の容器に入れかえないこと。
- (4) 保存の状況が悪いと，場合によっては虫，カビ等がつくことが考えられますので，上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は，原料として天然の生薬を用いていますので，製品により多少色が異なったり，開栓後，吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが，効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10
電話：03-3957-2997
○受付時間：9:00～17:00（土，日，祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931



一元製薬株式会社
東京都豊島区要町3-4-10