



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



のどの痛み、はれ、声がれに
漢方製剤

サトウ くふうげどくとう 驅風解毒湯 エキストローチ

- 驅風解毒湯は、中国の明の時代の医学書「万病回春」に収載されている漢方処方、のどがはれて痛む症状に用いられてきました。
- 驅風解毒湯の「うがいをしながらゆっくり飲む」という本来の用法をトローチ剤にすることによって、より服用しやすくしました。
- 薬効成分が長時間のどに接触することで、のどの痛み、はれに効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

【効能】

咽喉がはれて痛む次の諸症：のどのあれ・痛み・はれ・不快感、声がれ

【用法・用量】

下記の1回服用量を食間又は空腹時に、口中でかまずにゆっくり溶かして服用します。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人（15才以上）	1錠ずつ2錠まで	3回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



〔成分・分量〕 6錠中

駆風解毒湯乾燥エキス……………1,175mg

(駆風解毒湯)

防 風(ボウフウ) ……………	1.5g
牛 蒡子(ゴボウシ) ……………	1.5g
連 翹(レンギョウ) ……………	2.5g
荊 芥(ケイガイ) ……………	0.75g
羌 活(キョウカツ) ……………	0.75g
甘 草(カンゾウ) ……………	0.75g
桔 梗(キキョウ) ……………	1.5g
石 膏(セッコウ) ……………	2.5g

添加物として、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、サッカリンNa、香料、L-メントール、プロピレングリコールを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

(1) 本剤は吸湿しやすいためアルミ袋に入れてあります。袋を開封後、万一、シートの裏面が破損(あな等)してしまいますと、吸湿して濃褐色に変わることがありますのでご注意ください。



(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(3) 小児の手の届かない所に保管してください。

(4) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

(5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号