

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

44

ノンパースB

(けいがいれんぎょうとう
(錠)荊芥連翹湯)

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：

蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

〔用法・用量〕

食前1時間、又は空腹時、温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〔用法・用量に関する注意〕

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

[成分・分量] (本品100錠中)


自社製別紙規格

日局	トウキ末	1.23 g	日局	トウキ	1.5 g	水 荆 芥 連 翹 湯 工 キ ス 2.5 g
日局	シャクヤク末	1.23 g	日局	シャクヤク	1.5 g	
日局	センキュウ末	1.23 g	日局	センキュウ	1.5 g	
日局	オウレン末	1.23 g	日局	ジオウ	1.5 g	
日局	オウゴン末	1.23 g	日局	オウレン	1.5 g	
日局	オウバク末	1.23 g	日局	オウゴン	1.5 g	
日局	サンシシ末	1.23 g	日局	オウバク	1.5 g	
日局	カンゾウ末	1.23 g	日局	サンシシ	1.5 g	
日局	キキョウ末	1.76 g	日局	ボウフウ	1.5 g	
局外生規	ジオウ末	1.23 g	日局	カンゾウ	1.5 g	
別紙規格	ボウフウ末	1.23 g	日局	サイコ	2.0 g	
別紙規格	ハッカ末	1.23 g	日局	キキョウ	2.0 g	
別紙規格	サイコ末	1.76 g	日局	レンギョウ	2.0 g	
別紙規格	レンギョウ末	1.23 g	日局	ケイガイ	2.0 g	
局外生規	ケイガイ末	1.23 g	日局	キコク	2.0 g	
別紙規格	キコク末	1.23 g	日局	ビャクシ	2.0 g	
別紙規格	ビャクシ末	1.76 g	日局	ハッカ	1.5 g	

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光を避け、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことがありますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10