

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

ベルエムピル錠

慢性鼻炎・蓄膿症に

特 徴

- 「ベルエムピル錠」は、漢方の古典といわれる中国の医書「万病回春」^{マンビョウカイシュン}に収載されている処方をもとに、我が国で経験方として発展させた「荊芥連翹湯」^{ケイガイレンギョウトウ}という薬方からなるお薬です。
- 慢性鼻炎、蓄膿症などに効果があります。

⚠使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび



慢性鼻炎



蓄膿症

用法・用量

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(裏面につづきます)

成分

成人1日の服用量12錠(1錠351mg)中、次の成分を含んでいます。
荊芥連翹湯エキスパウダー…………… 3,000mg
(トウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウ・オウレン・オウゴン・オウバク・
サンシシ・レンギョウ・ケイガイ・ポウフウ・ハッカ・キジツ・カンゾウ各0.9g、
ビャクシ・キキョウ・サイコ各1.5gより抽出。)

添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、CMC-Na、二酸化ケイ素、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ヒプロメロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



健康アドバイス


●鼻は正しくかみましょう ●汚れた空気にご注意 ●皮膚を鍛えましょう



鼻炎になると鼻を頻繁にかむようになります。強くかみすぎると急性中耳炎を起こすこともあります。片方ずつ静にかみましょう。



大気汚染をはじめ、空気中のちりやほこり、高温、乾燥は鼻炎を慢性化させる原因になります。汚れた空気の中ではマスクをつけて鼻粘膜を守るようにしましょう。



鼻炎を繰り返しがちな人は、ふだんから皮膚マッサージなどをして体を鍛えましょう。鼻炎の主な原因であるかぜにかからないようにすることも大切です。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元

クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元

クラシエ 製薬株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)