



第2類医薬品

漢方煎専科

桂枝茯苓丸料加薏苡仁

125

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして

株式会社 タキザワ漢方廠

# 漢方薬 桂枝茯苓丸料加薏苡仁「タキザワ」 16D

## △＜使用上の注意＞



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振
- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って(\*)医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分・分量】

ケイヒ……………4.0g トウニン……………4.0g  
 ブクリョウ……………4.0g シャクヤク……………4.0g  
 ボタンビ……………4.0g ヨクイニン……………10.0g  
 1日分（1包15.0g×2）30.0g

### 【効能・効果】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：にきび、しみ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、月経不順、血の道症（注）

#### ＜効能・効果に関連する注意＞

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

### 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満	服用しないこと

#### ＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）



製造販売元  
 株式会社 **タキザワ漢方**  
 さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
 お客様相談室 ☎048-688-7923  
 受付時間：9時～18時（月～金）

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の間合せ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
 ☎0120-149-931

