

【生薬製剤】

香 蘇 発 表[®] 散

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 1ヵ月位(軽症の感冒に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

軽症の感冒、魚肉の中毒、^{じんましん}蕁麻疹、婦人科的疾患中の不快症(みぞおちのつかえ、肩こり、耳鳴、頭痛、めまい等)、更年期神経症^{a)}、ヒステリー

^{a)}更年期神経症：更年期に起こる神経症のことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

^{注)}「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	1g(添付のサジ1杯)	3回
12歳以上15歳未満	大人の2/3の量(0.67g)	
7歳以上12歳未満	大人の1/2の量(0.5 g)	
4歳以上 7歳未満	大人の1/3の量(0.33g)	
4歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤3g中

カ ン ゾ ウ	……0.75g	} エキス……1.7mL (固形物として0.5g)
コ ウ ブ シ	……2.0 g	
ショウキョウ	……0.5 g	
ソ ヨ ウ	……0.75g	
チ ン ビ	……1.5 g	
カ ン ゾ ウ 末		……2.4g
ショウキョウ末		……0.1g

- ・本剤は褐色で、特異なおいを有し、味は甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

香蘇発表散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1