



服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

せい  
精華

ごしゃじんきがん  
牛車腎気丸

商品番号

E302

本剤は、漢方の古典「<sup>さいせいほう</sup>濟生方」に収載された<sup>ごしゃじん きがん</sup>牛車腎気丸に準拠して製造された丸剤です。

中高年になると、手足が冷え、寒い時はもとより冷房などもこたえやすく、夜間はよくトイレに起きるとか尿の出がスッキリしない、足などがむくむというようなことが起こったり、腰が痛む、目がかすむなど、体のあちこちにいわゆる老化の兆しがみられるようになります。

これは漢方で生命のエネルギーに密接にかかわりがあるとされる「腎」の働きが衰え（漢方では「<sup>じん きょ</sup>腎虚」といいます）起こっている現象と考えられます。

<sup>ごしゃじん きがん</sup>牛車腎気丸は、<sup>はちみじおうがん</sup>八味地黄丸に、牛車の名にあるように<sup>ごしつ</sup>牛膝（イノコズチの根）と<sup>しゃぜんし</sup>車前子（オオバコの種子）を加えたお薬で上記の腎虚の症状を改善します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| その他  | のぼせ、どうき       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称  | 症 状                            |
|--------|--------------------------------|
| 間質性肺炎* | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。*     |
| 肝機能障害  | 全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。 |

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

## 【効能・効果】

疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿で時に口渴がある次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ。

## 【用法・用量】

水又は白湯（さゆ）で服用してください。

| 年 齢       | 1 回量       | 1 日服用回数 |
|-----------|------------|---------|
| 大人（15歳以上） | 8丸         | 3回      |
| 15歳未満     | 服用しないでください |         |

## 【成分・分量】


成分・分量（本剤24丸中）

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| ジオウ……………2.5 g                  | ボタンピ……………1.5 g  |
| サンシュユ……………1.5 g                | ケイヒ……………0.5 g   |
| サンヤク……………1.5 g                 | ゴシツ……………1.5 g   |
| タクシャ……………1.5 g                 | シャゼンシ……………1.5 g |
| ブクリョウ……………1.5 g                | 加工ブシ ………0.25 g  |
| より抽出した牛車腎気丸料エキス末2.4 gを含有しています。 |                 |

添加物として滑石、バレイショデンプンを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。）
- (4)水分が丸剤に付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## 【包装】

480丸

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることや、丸剤がくっつくことがあります。品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

原産国 中華人民共和国

発売元

 小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号

製造販売元

ハツ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀2-14-14