



服用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

せい か ご しゃ じん き がん 精華牛車腎気丸

第2類医薬品

(漢方製剤)

■特徴

この漢方薬は、中国宋代に著された『嚴氏濟生方』の《水腫論治》項に記載されている「牛車腎気丸（ごしゃじんきがん）」に基づいて製剤化されたエキス丸剤です。「牛車腎気丸」は、「加味腎気丸（かみじんきがん）」とも言われ、腎気を強める薬剤として知られている「八味地黄丸（はちみじおうがん）」に牛膝（ごしつ）と車前子（しゃぜんし）が加えられたものです。本剤は、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇がある方の下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）に効果があります。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたことがある人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	のぼせ、どうき

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる

- 1ヵ月位服用しても症状の改善がみられない場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
下痢

* ■効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

※裏面もお読み下さい。

■用法・用量

次の量を1日3回水又は白湯で服用して下さい。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
大人（15歳以上）	8丸	3回
15歳未満	服用しないで下さい。	

●服用に際しての注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤は15歳未満の小児には服用させないで下さい。

■成分・分量

大人1日の服用量24丸中に下記成分及び分量より得た牛車腎気丸料エキス末2.4gを含有します。

成 分	含有量	成 分	含有量
ジオウ	2.5g	ボタンピ	1.5g
サンシュユ	1.5g	ケイヒ	0.5g
サンヤク	1.5g	ゴシツ	1.5g
タクシャ	1.5g	シャゼンシ	1.5g
ブクリョウ	1.5g	ブシ	0.25g

※添加物として、バレイショデンプン、滑石を含有します。

■成分に関連する注意

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかないところに保管して下さい。
- (2) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

発 売 元

イスクラ産業株式会社
東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元

八ツ目製薬株式会社
〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-14-14