



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

せい か ご しゃ じん き がん 精華牛車腎気丸

第2類医薬品

(漢方製剤)

■特徴

この漢方薬は、中国宋代に著された『嚴氏濟生方』の《水腫論治》項に記載されている「牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)」に基づいて製剤化されたエキス丸剤です。「牛車腎気丸」は、「加味腎気丸(かみじんきがん)」とも言われ、腎気を強める薬剤として知られている「八味地黄丸(はちみじおうがん)」に牛膝(ごしつ)と車前子(しゃぜんし)が加えられたものです。本剤は、体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇がある方の下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)に効果があります。

⚠ 使用上の注意

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)

※裏面もお読みください。

■用法・用量

次の量を1日3回水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
大人(15歳以上)	8 丸	3 回
15歳未満	服用しないでください。	

●用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は15歳未満の小児には服用させないでください。

■成分・分量

大人(15歳以上)1日の服用量24丸中に下記成分及び分量より得た牛車腎気丸料エキス末(症候別治療、1/2量)2.4gを含有します。

成 分	含有量	成 分	含有量
ジオウ	2.5g	ボタンピ	1.5g
サンシュユ	1.5g	ケイヒ	0.5g
サンヤク	1.5g	ゴシツ	1.5g
タクシャ	1.5g	シャゼンシ	1.5g
ブクリョウ	1.5g	ブシ	0.25g

※添加物として、バレイショデンプン、滑石を含有します。

■成分に関連する注意

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

発 売 元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元

ハツ目製薬株式会社

〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-14-14