



服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

せいけ

ごしやじんきがん

精華牛車腎気丸

商品番号

E302

本剤は、漢方の古典「<sup>さいせいほう</sup>濟生方」に収載された牛車腎気丸に準拠して製造された丸剤です。

中高年になると、手足が冷え、寒い時はもとより夏でも冷房で冷えやすく、夜間はよくトイレに起きるとか尿の出がスッキリしない、足がむくんだり、腰が痛む、目がかすむなど、体のあちこちに老化の兆しがみられるようになります。

これは漢方で生命のエネルギーに密接にかかわりとされる「<sup>じん</sup>腎」の働きが衰え（漢方では「<sup>じんきょ</sup>腎虚」といいます）起こっている現象と考えられます。

牛車腎気丸は、<sup>はちみじおうがん</sup>八味地黄丸に、牛車の名にあるように牛膝（イノコズチの根）と車前子（オオバコの種子）を加えた漢方薬で上記の腎虚の症状を改善します。



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| その他  | 動悸、のぼせ        |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(裏面につづく)

## 【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症：  
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

## 【用法・用量】

水又は白湯（さゆ）で服用してください。

| 年 齢       | 1 回 量      | 1 日服用回数 |
|-----------|------------|---------|
| 大人（15歳以上） | 8丸         | 3回      |
| 15歳未満     | 服用しないでください |         |

## 【成分・分量】


| 成分・分量（本剤24丸中）   |                 |
|-----------------|-----------------|
| ジオウ……………2.5 g   | ボタンピ……………1.5 g  |
| サンシュユ……………1.5 g | ケイヒ……………0.5 g   |
| サンヤク……………1.5 g  | ゴシツ……………1.5 g   |
| タクシャ……………1.5 g  | シャゼンシ……………1.5 g |
| ブクリョウ……………1.5 g | ブシ……………0.25 g   |

より抽出した牛車腎気丸料エキス末（「症候別治療」、1/2量）2.4gを含有しています。

添加物として滑石、バレイショデンプンを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) めれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。  
水分は丸剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で丸剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。  
（詰めものは、輸送中に丸剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります）
- (7) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることや、丸剤がくっつくことがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

発売元

小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号

製造販売元

ハツ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀2-14-14

A2491