

【漢方薬】

五 積 腰 痛[®] 散

◆ 五積腰痛(ゴシヤクヨウツウ)散は和剤局方^{わだいさくくほう}という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の散剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。

排尿困難

- (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位(急性胃腸カタルに服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

急性・慢性胃腸カタル^{a)}、腰痛、白帯下^{b)}、月経痛、神経痛、リウマチ、脚気、打撲、冷え症

^{a)}胃腸カタル：胃腸炎のことを示します。

^{b)}白帯下：おりもののことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1g(添付のサジ1杯)	1包	3回
12歳以上15歳未満	大人の2/3の量(0.667g)	2/3包	
7歳以上12歳未満	大人の1/2の量(0.5 g)	1/2包	
4歳以上 7歳未満	大人の1/3の量(0.333g)	1/3包	
4歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤3g又は3包中

カンゾウ… 6mg	タイソウ…191mg	} エキス…319mg
キキョウ…191mg	チンピ…447mg	
キジツ…447mg	トウキ…447mg	
ケイヒ… 6mg	ハング…447mg	
コウボク…191mg	ビヤクシ…447mg	
シャクヤク…191mg	ビヤクジュツ… 6mg	
ショウキョウ… 6mg	ブクリョウ… 6mg	
センキュウ…191mg	マオウ…191mg	

カンゾウ末……638mg
 ケイヒ末……319mg
 ショウキョウ末……128mg
 ソウジュツ末……958mg
 ブクリョウ末……638mg

- ・本剤は淡褐色で、特異なおいを有し、味は初めわずかに甘く後わずかに辛い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

五積腰痛散は漢薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1