

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【生薬製剤】

五積腰痛[®]散

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位(急性胃腸カタルに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

急性・慢性胃腸カタル^{a)}、腰痛、白帯下^{b)}、月経痛、神経痛、リウマチ、脚気、打撲、冷え症

a)胃腸カタル：胃腸炎のことを示します。

b)白帯下：おりもののことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2~3時間を指します。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1g(添付のサジ1杯)	1包	3回
12歳以上15歳未満	大人の2/3の量(0.667g)	2/3包	
7歳以上12歳未満	大人の1/2の量(0.5 g)	1/2包	
4歳以上 7歳未満	大人の1/3の量(0.333g)	1/3包	
4歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤3g又は3包中

カンゾウ…	6mg	タイソウ…	191mg	} エキス…319mg
キキョウ…	191mg	チンピ…	447mg	
キジツ…	447mg	トウキ…	447mg	
ケイヒ…	6mg	ハンゲ…	447mg	
コウボク…	191mg	ビヤクシ…	447mg	
シャクヤク…	191mg	ビヤクジュツ…	6mg	
ショウキョウ…	6mg	ブクリョウ…	6mg	
センキュウ…	191mg	マオウ…	191mg	

カンゾウ末…638mg

ケイヒ末…319mg

ショウキョウ末…128mg

ソウジュツ末…958mg

ブクリョウ末…638mg

- ・本剤は淡褐色で、特異なおいを有し、味は初めわずかに甘く後わずかに辛い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

五積腰痛散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1