

【生薬製剤】

五 積 腰 痛 散

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
 排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
ひ ふ 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 1ヵ月位(急性胃腸カタルに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

急性・慢性胃腸カタル^{a)}、腰痛、白帯下^{b)}、月経痛、神経痛、リウマチ、脚気、打撲、冷え症

a)胃腸カタル：胃腸炎のことを示します。

b)白帯下：おりものることを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2~3時間を持ちます。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1g(添付のサジ1杯)	1包	3回
12歳以上15歳未満	大人の2/3の量(0.667g)	2/3包	
7歳以上12歳未満	大人の1/2の量(0.5 g)	1/2包	
4歳以上 7歳未満	大人の1/3の量(0.333g)	1/3包	
4歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤3g又は3包中

カ　ン　ゾ　ウ.....	6mg	タ　イ　ソ　ウ.....	191mg	エキス...319mg
キ　キ　ヨ　ウ.....	191mg	チ　ン　ビ.....	447mg	
キ　ジ　ツ.....	447mg	ト　ウ　キ.....	447mg	
ケ　イ　ヒ.....	6mg	ハ　ン　ゲ.....	447mg	
コ　ウ　ボ　ク.....	191mg	ビ　ヤ　ク　シ.....	447mg	
シャク　ヤク.....	191mg	ビ　ヤ　ク　ジ　ュ　ツ.....	6mg	
ショウ　キ　ヨ　ウ.....	6mg	ブ　クリ　ヨ　ウ.....	6mg	
セン　キ　ユ　ウ.....	191mg	マ　オ　ウ.....	191mg	

カ　ン　ゾ　ウ　末.....638mg
ケ　イ　ヒ　末.....319mg
ショウ　キ　ヨ　ウ　末.....128mg
ソ　ウ　ジ　ュ　ツ　末.....958mg
ブ　クリ　ヨ　ウ　末.....638mg

- ・本剤は淡褐色で、特異なにおいを有し、味は初めわずかに甘く後わざかに辛い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

五積腰痛散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号