

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるように大切に保存すること。

漢方薬 ご れい きん 五苓散料エキス錠〔大峰〕

【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分・分量】

本品1日量(12錠)中
 「日局」タ ク シ ャ…… 2.5g 「日局」ビヤクジュツ…… 1.5g
 「日局」チ ョ レ イ…… 1.5g 「日局」ケ イ ヒ…… 1.0g
 「日局」ブクリョウ…… 1.5g

上記生薬より得た五苓散エキス(1/2量)1050mgを含む。

なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースCa、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化アルミナマグネシウム、乳糖を含む。

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：
 水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹^注のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔
^注「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことです。

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用すること。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人 (15歳以上)	4 錠	3 回
15歳未満 7歳以上	3 錠	
7歳未満 5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり、品質が変わることがある）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんので安心して服用してください。

*【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室
 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4
 電 話：0120-019-776
 受付時間：9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元 **日邦薬品工業株式会社**
 東京都渋谷区代々木3丁目46番16号
<https://www.nippo-yakuhin.jp/>



* 発 売 元 **伸和製薬株式会社**
 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4



製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**
 奈良県大和高田市根成柿574番地