

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

漢方薬

五苓散料エキス錠〔大峰〕



【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(急性胃腸炎、二日酔)に服用する場合には5~6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】本品1日量(12錠)中

「日局」タ ク シ ヤ……2.5g 「日局」ビヤクジュツ……1.5g
 「日局」チ ョ レ イ……1.5g 「日局」ケ イ ヒ……1.0g
 「日局」ブクリョウ……1.5g

上記生薬より得た五苓散エキス(1/2量)1050mgを含む。

なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースCa、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化アルミナマグネシウム、乳糖を含む。

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：

水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹^注)のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

^注「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便秘を催すものこと。

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。
(食間とは、食後2~3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4 錠	3回
15歳未満7歳以上	3 錠	
7歳未満5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出ることがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用してください。

*【お問い合わせ先】

伸和製薬株式会社 情報管理室
 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4
 電 話：0120-019-776
 受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

*発 売 元

伸和製薬株式会社
 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4



製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社
 奈良県大和高田市根成柿574番地