

漢方の軟膏剤

ジュンキコウ

第2類医薬品

『ジュンキコウの特長』

ジュンキコウは医療のために生薬の紫根の名を高めた江戸時代の医人、華岡青洲家方を漢方処方として創製した軟膏の紫雲膏です。

ジュンキコウは「外傷・痔疾・火傷など」の止血、鎮痛、肉芽新生の促進や「しもやけ・あせも・ただれなど」の皮膚疾患にすぐれた効きめがあります。

使用上の注意

してはいけないこと

〔守らないと現状の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕
次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。
- (3) 傷口が化膿している人。
- (4) 患部が広範囲の人。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
医師の治療を受けている人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎

用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をご覧ください。

用法・用量

1日2～3回、患部に適量を塗布するか、又は、ガーゼにのぼして貼布してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 外用にのみ使用してください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。

成分・分量

成分	分量 (120g中)
ゴマ油	100.0g
トウキ	10.0g
シコン	10.0g
ミツロウ	38.0g
豚脂	2.5g

〔注 意〕

本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがあります、効果に変わりありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

お問合わせ先

本剤について何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社和漢薬研究所 お客様相談室

0120 -432 -894

[月～金曜日/10:00～17:00 (祝日を除く)]

製造販売元：株式会社 **和漢薬研究所**

〒371-0101 群馬県 前橋市富士見町赤城山1193