

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

(26)

しょうせいりゅうとう
錠剤 小青竜湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
 排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヶ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の諸症：
 気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

[用法・用量]

食前1時間、又は空腹時、温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〔用法・用量に関する注意〕

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕(本品100錠中)

自社製別紙規格					
日局	シャクヤク末	2.5 g	日局	マオウ	3.0 g
日局	カンゾウ末	2.5 g	日局	シャクヤク	3.0 g
日局	ケイヒ末	2.5 g	日局	カンゾウ	3.0 g
局外生規	マオウ末	2.5 g	日局	ケイヒ	3.0 g
別紙規格	ハンゲ末	5.0 g	日局	サイシン	3.0 g
別紙規格	ゴミシ末	2.5 g	日局	ゴミシ	3.0 g
別紙規格	サイシン末	2.5 g	日局	ハンゲ	6.0 g
別紙規格	カンキョウ末	2.5 g	日局	カンキョウ	3.0 g
					2.5 g

別紙規格外
小青竜湯性工
キス

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことがありますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

~~~~~〔お問い合わせ先〕~~~~~

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話 : 03-3957-2997

○受付時間 : 9:00~17:00(土、日、祝祭日を除く)

副作用被害救済制度の窓口先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10