

しょうはんげかぶくりょうとう
サンワ 小半夏加茯苓湯 エキス細粒

サンワ小半夏加茯苓湯エキス細粒は、漢方処方「小半夏加茯苓湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止
し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する
こと

成 分

本品1日量 …………… 6g 中
小半夏加茯苓湯水製エキス …… 1.4g

〔 ハ ン ゲ …………… 8.0g
シ ョ ウ キ ョ ウ …………… 1.5g
ブ ク リ ョ ウ …………… 5.0g
上記の生薬より抽出したエキス 〕

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して
保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり
品質が変わる。)

適応症

体力に関わらず使用でき、悪心があり、ときに嘔吐するものの
次の諸症：
つわり、嘔吐、悪心、胃炎

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

消費者くすり相談室 TEL 0570-095770
10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	2.0g
7才～14才	1.3g
4才～6才	1.0g
4才未満	服用しないこと

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が
異なることもございますが、効能・効果にはかわりございま
せん。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 添付のサジすりきり1杯が約2gです。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
服用させること。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1