

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

[第2類医薬品]

(29)

錠剤 消風散

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

体力中等度以上の人の皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも

[用法・用量]

食前1時間、又は空腹時服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕(本剤100錠中)

自社製別紙規格					
日局	トウキ末	2.8 g	日局	トウキ	3.0 g
日局	クジン末	0.9 g	日局	シオウ	3.0 g
日局	ソウシユツ末	1.9 g	日局	ボウフウ	2.0 g
日局	カンゾウ末	0.9 g	日局	チモ	1.5 g
局外生規	ジオウ末	2.8 g	日局	クジン	1.0 g
別紙規格	ボウフウ末	1.9 g	日局	ソウシユツ	2.0 g
別紙規格	センタイ末	0.9 g	日局	セッコウ	3.0 g
別紙規格	チモ末	1.5 g	日局	モクツウ	2.0 g
別紙規格	ゴマ末	1.5 g	日局	カンゾウ	1.0 g
局外生規	ケイガイ末	0.9 g	日局	ケイガイ	1.0 g
別紙規格	ゴボウシ末	1.9 g	局外生規	センタイ	1.0 g
別紙規格	セッコウ末	2.8 g	日局	ゴマ	1.5 g
別紙規格	モクツウ末	1.9 g	日局	ゴボウシ	2.0 g

別紙規格水製工キス

2.4 g

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことがありますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

~~~~~〔お問い合わせ先〕~~~~~

一元製薬株式会社「お客様相談室」  
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10  
電話：03-3957-2997  
○受付時間：9:00～17:00(土、日、祝祭日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10